

■ **Lei è stato sottoposto ad intervento di chirurgia orale.**
Di seguito le indicazioni da seguire nelle prime 24 ore successive all'intervento:

- Non risciacquare continuamente la bocca con acqua al fine di evitare la ripresa di sanguinamento.
- Lavare i denti normalmente dopo i pasti effettuando un solo risciacquo con il collutorio consigliato dall'odontoiatra.
- Applicare la borsa del ghiaccio all'esterno sulla guancia o sulle labbra a seconda della zona in cui è stato eseguito l'intervento. L'applicazione di ghiaccio deve durare circa venti minuti e deve essere seguita da dieci minuti di riposo. La procedura deve essere ripetuta per tutto il giorno dell'intervento. La non applicazione del ghiaccio potrebbe causare l'aumento del gonfiore o del dolore.
- Mangiare cibi tiepidi o freddi per evitare che il sanguinamento della ferita aumenti.
- Applicare la protesi soltanto dopo aver consultato il proprio dentista.
- Assumere con regolarità i farmaci prescritti.
- Evitare sforzi ed attività sportiva.
- Non assumere aspirina per evitare emorragie.

■ **Dopo un intervento di chirurgia orale o implantologica non preoccuparsi in caso di:**

1. Gonfiore esterno in corrispondenza della zona operata.
2. Ematoma sulla cute in corrispondenza della zona operata.
3. Dolore. Se il dolore non è sufficientemente controllato dalla terapia prescritta dall'odontoiatra, contattare lo studio.

In caso di disturbi diversi da quelli descritti contattare lo studio.

Note:

.....